

Seven-spot ladybird

1 Identity Card

- ⇒ Order: Beetles
- ⇒ Family: Coccinellidae
- ⇒ Lifespan: 1 year
- ⇒ Size: 5 to 8 mm
- ⇒ Observation period: March to October

6 Habitat

The 7-spotted ladybug is found everywhere in **OPEN GRASSLAND AND HERBACEOUS HABITATS** (meadows, wastelands, forest edges, parks, gardens, etc.).

5 Reproduction

IN SPRING, THE MALE AND THE FEMALE MATE.

The female lays between 100 and 400 yellow eggs, always near an aphid colony. After 3 to 7 days, the eggs hatch and the larvae emerge.

In case of danger, it secretes a drop of bright yellow, very bitter liquid. As a result, birds associate its bright color with a bad taste and do not pursue it.

2 Diet

THE LADYBUG AND ITS LARVA FEED EXCLUSIVELY ON APHIDS.


As an adult, it can consume up to 100 aphids per day. The larvae, even more voracious, can eat up to 150 per day. In the garden, aphids are pests; therefore, the ladybug is highly valued by gardeners.

3 Identification

IT HAS A ROUNDED ABDOMEN, reddish-orange elytra (hard, horn-like wings), each with 3 black spots. A seventh spot is located at the rear of the thorax.

4 Did You Know?

There are several species of ladybugs: **2-SPOTTED, 22-SPOTTED, AND EVEN STRIPED ONES.**



Siebenpunkt-Marienkäfer



1

Steckbrief

- ⇒ Familie: Käfer
- ⇒ Ordnung: Coccinellidae
- ⇒ Lebensdauer: 1 Jahr
- ⇒ Größe: 5 bis 8 mm
- ⇒ Beobachtungszeitraum: März bis Oktober



2

Ernährung

DER MARIENKÄFER UND SEINE LARVE ERNÄHREN SICH AUSSCHLIESSLICH VON BLATTLÄUSEN.

Als erwachsenes Tier frisst er bis zu 100 davon pro Tag. Die Larven, die noch gefräßiger sind, können bis zu 150 pro Tag vertilgen. Im Garten ist die Blattlaus ein Schädling; daher ist der Marienkäfer bei Gärtnern sehr beliebt.



6

Lebensraum



Der Siebenpunkt-Marienkäfer ist überall in **OFFENEN UND GRASIGEN LEBENSRAUMEN** vertreten (Wiesen, Brachflächen, Waldränder, Parks, Gärten usw.).

5

Fortpflanzung

IM FRÜHLING PAAREN SICH MÄNNCHEN UND WEIBCHEN.

Das Weibchen legt zwischen 100 und 400 gelbe Eier, immer in der Nähe einer Blattlauskolonie. Nach 3 bis 7 Tagen schlüpfen die Eier und die Larven kommen heraus.



3

Merkmale

SIE HAT EINEN GEWÖLBTEN HINTERLEIB, rot-orangefarbene Flügeldecken (harte, hornartige Flügel) mit jeweils 3 schwarzen Punkten. Ein siebter Punkt befindet sich hinten am Thorax.



4

Wussten Sie schon?

Es gibt verschiedene Arten von Marienkäfern: **MIT 2 PUNKTEN, MIT 22 PUNKTEN UND SOGAR GESTREIFTE ARTEN.**



Bei Gefahr scheidet sie einen Tropfen einer leuchtend gelben und sehr bitteren Flüssigkeit aus. Auf diese Weise assoziieren Vögel ihre leuchtende Farbe mit einem schlechten Geschmack und jagen sie nicht.

